



## Ergebnisse der Untersuchungen von Felchen auf den Befall mit *Triaenophorus crassus* (Hechtbandwurm)

Daten der nationalen Fischuntersuchungsstelle (NAFUS), Bern

Jahr	Lungerersee		Sarnersee		Alpnachersee	
	Befallsstärke	Anteil befallene Fische	Befallsstärke	Anteil befallene Fische	Befallsstärke	Anteil befallene Fische
1991	++ bis +++	9 von 10	++ bis +++	6 von 10	+	2 von 10
1992	+++	10 von 10	++	7 von 10	kein Befall	0 von 10
1993	++	4 von 10	+	1 von 10	kein Befall	0 von 10
1994	++	9 von 10	+ bis +++	4 von 10	+	1 von 10
1995	+	4 von 10	kein Befall	0 von 10	++	1 von 10
1996	+	8 von 10	+	8 von 10	+	5 von 10
1997	++ bis +++	9 von 10	+ bis ++	4 von 10	kein Befall	0 von 10
1998	+ bis ++	8 von 10	+ bis +++	6 von 10	+ bis ++	3 von 10
1999	+ bis +++	7 von 10	keine Untersuchung	keine Untersuchung	kein Befall	0 von 10
2000	+ bis +++	10 von 10	+ bis +++	10 von 10	kein Befall	0 von 10
2001	+ bis ++	9 von 10	+ bis ++	5 von 10	kein Befall	0 von 10
2002	+ bis ++	8 von 10	+	9 von 10	vereinzelt	1 von 10
2003	+ bis ++	10 von 10	+ bis ++	10 von 10	+	4 von 10
2004	+ bis ++	6 von 10	+ bis ++	8 von 10	+ bis ++	6 von 10
2005	+ bis ++	8 von 10	+ bis ++	7 von 10	+ bis ++	8 von 10
2006	+ bis ++	7 von 10	++	8 von 10	+	3 von 10
2007	+	4 von 10	+	4 von 10	+	7 von 10
2008	+ bis ++	9 von 10	+ bis ++	3 von 7	+ bis ++	10 von 10
2009	+ bis +++	6 von 10	+	5 von 10	+ bis ++	5 von 10
2010	+	3 von 10	kein Befall	0 von 10	+ bis ++	8 von 10
2011	+ bis ++	6 von 10	++	10 von 10	++ bis +++	10 von 10
2012	++	10 von 10	+ bis ++	8 von 10	++	10 von 10
2013	keine Untersuchung	keine Untersuchung	+ bis ++	8 von 10	++ bis +++	15 von 15
2014	+ bis ++	11 von 11	+ bis ++	8 von 10	++	11 von 11
2015	+ bis ++	7 von 9	+ bis ++	7 von 10	++	10 von 10
2016	+ bis ++	10 von 10	+ bis ++	9 von 10	+ bis +++	10 von 10
2017	keine Untersuchung	keine Untersuchung	keine Untersuchung	keine Untersuchung	keine Untersuchung	keine Untersuchung
2018	+ bis +++	7 von 8	+ bis +++	10 von 10	+ bis +++	6 von 10
2019	++	10 von 10	++	9 von 10	+	8 von 10

### Erklärungen:

Befallsstärke: Mass für die Anzahl *Triaenophorus*-Larven in der Muskulatur der befallenen Felchen  
 + leichtgradiger Befall, ++ mittelgradiger Befall, +++ hochgradiger Befall

Anteil befallene Fische: Anzahl befallene Felchen von in der Regel 10 untersuchten Felchen